

Příprava na CT vyšetření požadovaná Radiodiagnostickým oddělením Nemocnice Tábor, a. s.

CT břicha, pánve, břicha a pánve, jater, pankreatu, sleziny

- **Čtyři hodiny před výkonem nepřijímat již žádnou pevnou stravu a nekouřit!!**
- Večer před vyšetřením rozpustit 1 ampuli tj. 20 ml ULTRAVISTU 300 (370) v 1000 ml neperlivé vody a vypít. V den vyšetření 1 ampuli tj. 20 ml ULTRAVISTU 300 (370) rozpustit v 1000 ml neperlivé vody, kontinuálně popíjet 2 hodiny před vyšetřením a dopít těsně před vyšetřením. Pacient nesmí dle možností minimálně 1 hodinu před vyšetřením močit, případný permanentní katétr uzavřít.
- Před a po vyšetření jodovou kontrastní látkou je třeba vysadit léky obsahující METFORMIN, které se používají k léčbě cukrovky. Pacient **nesmí lék užívat 1-2 dny před vyšetření, v den vyšetření a 1 den po vyšetření.**

CT enterografie

- Čtyři dny před vyšetřením nejíst potraviny, které obsahují zrníčka a slupky (např. rybíz, hroznové víno, kiwi, papriky, rajská jablka, zelí, luštěniny, celozrnné pečivo).
- Den před vyšetřením je možné snídat, k obědu pouze polévku, ale už nevečeřet. Pít – minerálky (raději neperlivé), vynechat kávu, černý čaj, mléko, čaj pouze ovocný nebo bylinkový.
- Den před vyšetřením vypít 3 l Fortrans roztoku. Začít popíjet v 16 hodin a pít rychlostí 1 litr za hodinu.
- **Čtyři hodiny před výkonem omezit perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (100 ml/hod.), nepřijímat již žádnou pevnou stravu a nekouřit!!**
- **Dostavte se na Radiodiagnostické oddělení 1,5 hodiny před časem na který jste objednáni!!**
- Před a po vyšetření jodovou kontrastní látkou je třeba vysadit léky obsahující METFORMIN, které se používají k léčbě cukrovky. Pacient **nesmí lék užívat 1-2 dny před vyšetření, v den vyšetření a 1 den po vyšetření.**

CT colonografie

- Čtyři dny před vyšetřením nejíst potraviny, které obsahují zrníčka a slupky (např. rybíz, hroznové víno, kiwi, papriky, rajská jablka, zelí, luštěniny, celozrnné pečivo).
- Den před vyšetřením je možné snídat, k obědu pouze polévku, ale už nevečeřet. Pít – minerálky (raději neperlivé), vynechat kávu, černý čaj, mléko, čaj pouze ovocný nebo bylinkový.
- Den před vyšetřením vypít 3 l Fortrans roztoku. Začít popíjet v 16 hodin a pít rychlostí 1 litr za hodinu.
- **Čtyři hodiny před výkonem omezit perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (100 ml/hod.), nepřijímat již žádnou pevnou stravu a nekouřit!!**
- Před a po vyšetření jodovou kontrastní látkou je třeba vysadit léky obsahující METFORMIN, které se používají k léčbě cukrovky. Pacient **nesmí lék užívat 1-2 dny před vyšetření, v den vyšetření a 1 den po vyšetření.**

CT mozku, plic, ledvin s podáním kontrastní látky i. v. a CT angiografie

- Čtyři hodiny před výkonem omezit perorální příjem pouze na čiré tekutiny v malém množství (100 ml/hod.), nepřijímat již žádnou pevnou stravu a nekouřit!!
- Před a po vyšetření jodovou kontrastní látkou je třeba vysadit léky obsahující METFORMIN, které se používají k léčbě cukrovky. Pacient **nesmí lék užívat 1-2 dny před vyšetření, v den vyšetření a 1 den po vyšetření.**

CT žaludku a CT pankreatu pro suspekci na insulinom či gastrinom

- Čtyři hodiny před výkonem nepřijímat již žádnou pevnou stravu a nekouřit!! Pít je možné čistou vodu.
- Dostavte se na Radiodiagnostické oddělení 0,5 hodiny před časem, na který jste objednáni!!
- Před a po vyšetření jodovou kontrastní látkou je třeba vysadit léky obsahující METFORMIN, které se používají k léčbě cukrovky. Pacient **nesmí lék užívat 1-2 dny před vyšetření, v den vyšetření a 1 den po vyšetření.**

CT vyšetření na která není nutná žádná příprava

- Páteř, VDN, HRCT plic