



Stanice lékařské mikrobiologie – Centrální laboratoře, Nemocnice Tábor a.s.
Kpt. Jaroše 2000, Tábor 390 03, tel.: 381 60 73 70, mlb@nemta.cz

Žádanka o mikrobiologické vyšetření

Příjmení:	Jméno:	Razítko (IČZ):
Číslo pojištění:		
Bydliště:		
Zdravotní pojišťovna:	Datum odběru:	Podpis:
Datum narození:	Čas odběru:	
Diagnóza:	Odebral:	

SEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

primární vzorek:

☐ sérum ☐ likvor ☐ punktát ☐ cervix ☐ uretra ☐ moč ☐ sperma

Hepatitidy	Respirační blok	Zoonózy
☐ markery virových hepatitid - vše	☐ Chlamydia pneumoniae	☐ Brucella abortus
☐ anti HAV IgM	☐ konfirmace western blot	☐ Francisella tularensis
☐ anti HAV total	☐ Mycoplasma pneumoniae	☐ Toxoplasma gondii
☐ HBsAg	STD blok	☐ Toxocara canis
☐ anti HBs	☐ Mycoplasma hominis	☐ Listeria monocytogenes
☐ anti HBc total	☐ Ureoplasma urealyticum	Ostatní vyšetření
☐ anti HBc IgM	☐ Syfilis (Ab + RPR)	☐ ASLO
☐ HBeAg	☐ HIV (Ag + Ab)	☐ Spalničky IgG
☐ anti HbBe	☐ Chlamydia trachomatis (Ag)	☐ Spalničky IgM
☐ HCV (Ag + Ab)	Nákazy přenášené klíšťaty	
Herpetický blok	☐ TBEV (klíšťová encefalitida)	
☐ CMV	☐ Borrelióza	
☐ EBV	☐ konfirmace western blot	

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

primární vzorek:

☐ nesrážlivá krev EDTA ☐ srážlivá krev ☐ primárně sterilní klinický materiál ☐ jiný klinický materiál ☐ likvor

Respirační blok	STD blok	Panel bakteriálních meningitid
☐ Panel respiračních virů (Parainfluenza virus, Coronavirus, Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus)	☐ Ureaplasma species	☐ Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae
☐ Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica	☐ Chlamydia trachomatis	Ostatní vyšetření
☐ Legionella pneumophila	☐ Mycoplasma hominis/genitaleum	☐ Enterovirus
☐ Mycobacterium tuberculosis komplex	☐ Neisseria gonorrhoeae	☐ Clostridium difficile toxin
☐ Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae	Herpetický blok	
☐ Influenza A/B	☐ Herpes simplex 1,2	
☐ virus SARS-CoV2	☐ Varicella zoster virus	
	☐ EBV	
	☐ CMV	

Pokyny pro odběr vzorků na vyšetření PCR:

panel respiračních virů

materiál: sputum¹, BAL², nazofaryngeální výtěr³

způsob odběru: sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{1,2}, výtěrová souprava s virologickým médiem³, oranžová výtěrovka s drátkem rayon³, dacronová výtěrovka³

Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae

materiál: plná krev¹, tkáň², bronchoalveolární laváž³, stěr⁴

způsob odběru: EDTA zkumavka¹, sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{2,3}, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)⁴, dacronová výtěrovka⁴

Mycobacterium tuberculosis komplex

materiál: sputum¹

způsob odběru: sterilní sputovka/kontejner s víčkem¹

Bordetella pertussis/parapertussis/brochiseptica

materiál: nazofaryngeální výtěr¹, orofaryngeální výtěr²

způsob odběru: výtěrová souprava s transportním médiem^{1,2}, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)^{1,2}, dacronová výtěrovka^{1,2}

Influenza A/B

materiál: nazofaryngeální výtěr¹

způsob odběru: výtěrová souprava s virologickým médiem¹

SARS-CoV-2

materiál: nazofaryngeální výtěr¹, sputum², výplach z nosu³, BAL⁴

způsob odběru: výtěrová souprava s virologickým médiem¹, oranžová výtěrovka s drátkem rayon¹, dacronová výtěrovka¹, sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{2,3,4}

Pro vyšetření respiračních virů doporučujeme **vždy používat výtěrovou soupravu s virologickým médiem**.

Clostridium difficile toxin

materiál: stolice¹

způsob odběru: sterilní kontejner s víčkem¹

Enterovirus

materiál: plná krev¹, likvor², výkaly³

způsob odběru: EDTA zkumavka¹, sterilní zkumavka², sterilní kontejner s víčkem³

STD blok

materiál: cervikální stěr¹, stěr z močové trubice², stěr ze spojivky³, moč⁴ (první proud), prostatická tekutina⁵, sperma⁶

způsob odběru: oranžová výtěrovka s drátkem rayon^{1,2,3}, dacronová výtěrovka^{1,2,3}, sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{4,5,6}

Herpes simplex 1,2

materiál: plná krev¹, plasma², tkáň³, likvor⁴, seminální tekutina⁵, prostatická tekutina⁶, výtěr (děložní/uretrální/spojivkový)⁷

způsob odběru: EDTA zkumavka^{1,2}, sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{3,5,6}, sterilní zkumavka⁴, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)⁷, dacronová výtěrovka⁷

Varicella Zoster virus

materiál: plná krev¹, plasma², tkáň³, výtěr⁴, likvor⁵, seminální tekutina⁶, prostatická tekutina⁷

způsob odběru: zkumavka pro separaci séra¹, EDTA zkumavka², sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{3,6,7}, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)⁴, dacronová výtěrovka⁴, sterilní zkumavka⁵

EBV

materiál: plná krev¹, buffy coat², plasma³, tkáň⁴, moč⁵, výtěr z orofaryngeální dutiny⁶, sputum⁷, likvor⁸

způsob odběru: zkumavka pro separaci séra¹, EDTA zkumavka^{2,3}, sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{4,5,7}, výtěrová souprava s virologickým médiem⁶, sterilní zkumavka⁸

CMV

materiál: periferní/pupečníková krev¹, plasma², likvor³, tkáň⁴, stěr (z děložního čípku/močové trubice/spojivky)⁵, moč⁶

způsob odběru: EDTA zkumavka^{1,2}, sterilní zkumavka³, oranžová výtěrovka s drátkem (rayon)⁵, dacronová výtěrovka⁵, sterilní sputovka/kontejner s víčkem^{4,6}

Panel bakteriálních meningitid

materiál: likvor¹

způsob odběru: sterilní zkumavka¹