



INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYŠETŘENÍM MAGNETICKOU REZONANCÍ: DODATEK Č. 1 – MR PROSTATY

Pacient:

Jméno a příjmení:.....

R.č.:.....

Vážený pane,

pro zlepšení hodnocení MR vyšetření prostaty je důležité, aby ve střevech a konečníku nebyl přítomen plyn. Jeho přítomnost vytváří artefakty v MR obraze a snižuje hodnocení zhotovených snímků (zejména difuzně vážených).

K eliminaci přítomnosti plynu je vhodné vynechat ze stravy **dva dny před vyšetřením nadýmavé potraviny** (zelí, kapusta, brokolice, květák, luštěniny, cibule, česnek, silně kořeněná jídla, sycené nápoje, kynuté pečivo, alkohol, vejce, mléko či sýry).

Důležitá je také příprava **glycerinovými čípkami**. Jak již bylo zmíněno, důvodem je vyprázdnění rekta, které zlepšuje hodnocení vyšetření. První čípek se aplikuje večer před vyšetřením a druhý ráno v den vyšetření. Ráno se cca 30 minut po aplikaci čípku pokuste vyprázdnit. O pokus o vyprázdnění budete požádán ještě před vyšetřením.

I přes tuto přípravu je možné, že bude plyn v rektu přítomen, což zjistíme po provedení prvních snímků. V takovém případě je žádoucí plyn z konečníku odstranit. To bude provedeno tak, že Vám do konečníku bude zavedena rektální rourka, která bude potřena gelem pro komfortnější zavedení. Následně přes zavedenou rourku plyn odsajeme pomocí stříkačky. Po odsátí plynu bude rektální rourka z konečníku odstraněna.

Máte právo výše uvedená doporučení a výkony odmítnout. V případě, že bude během vyšetření přítomen plyn, bude hodnocení některých vyšetřovacích sekvencí (sérií snímků), a tedy i celého MR vyšetření prostaty omezena.

Dle doporučení jsem dodržel nenadýmavou stravu dva dny před vyšetřením.	ANO	NE
Zavedl jsem si do konečníku dva glycerinové čípky (jeden večer a jeden ráno).	ANO	NE
Souhlasím s případným zavedením rektální rourky k odsátí plynu.	ANO	NE

Prohlašuji, že jsem mohl/a klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno, a že jsem informacím a poučení plně porozuměl/a, nemám žádné další dotazy.

V Táboře dne:.....

Podpis pacienta:.....